

Date de mise en œuvre et lots supplémentaires
2010

Pourcentage du paquet couvert

Les mises en garde sanitaires doivent couvrir 43 % de la face avant et 53 % du dos des emballages des produits du tabac, y compris de la bordure. En tout, 48 % de la surface externe du paquet sont réservés aux mises en garde sanitaires.

Calendrier de rotation et historique












Quatorze mises en garde sanitaires sont utilisées sur les paquets de cigarettes.

Restrictions relatives aux informations trompeuses

Non précisé.

ÉTIQUETTES DE MISE EN GARDE

2010

 <p>Smēķēšana izraisa stipru atkarību, nesāc!</p>	 <p>Tabakas dūmi satur benzolu, nītrozambūsus, formaldehīdu un zīrkābi</p>	 <p>Smēķēšana grūtniecības laikā kaitē Jūsu bērnam</p>	 <p>Smēķēšana var pasliktināt asinsriti un izraisīt impotenci</p>
 <p>Smēķēšana var izraisīt iēnu un mokošu nāvi</p>	 <p>Smēķētāji mirst jauni</p>	 <p>Smēķēšana izraisa neārstojamu plaušu vēzi</p>	 <p>Sargiet bērnus: nelieciet viņiem elpot tabakas dūmus!</p>
 <p>Smēķēšana paātrina ādas novecošanos</p>	<p>0803 00 00 00 Izvēlieties brīvību, mēs jums palīdzēsim Lūdz palīdzību, lai atņemtu smēķēšanu</p>	<p>Jūs varat to izdarīt, mēs varam palīdzēt Pārtraukt smēķēšanu jums var palīdzēt Jūsu ģimenes ārsts un farmaceits</p>	<p>Koronārās sirds slimības risks samazinās par 50% pēc 1 gada atturēšanās no smēķēšanas Smēķēšanas atmešana samazina rībošu saslimt ar neārstojamām sirds un plaušu slimībām</p>
 <p>Smēķēšana var ātri samazināt asinsspiedienu un rada sirdslēkmes un insultu</p>	 <p>Smēķēšana var kaitēt spermatozoidiem un samazināt auglību</p>		